

Lue tämä pakkauseloste huolellisesti ennen käyttöä. Älä heitä pois pakkauksesta, se sisältää tärkeitä tietoja.

## KÄYTÖÖHJEEN SISÄLTÖ

1. MIIN MINUA KÄYTETÄÄN
2. MITEN MINUA KÄYTETÄÄN
3. OLE VAROVAINEN
4. AINESOSAT
5. MINUN SÄILYTTÄMINEN
6. YHTEYSTIEDOT

### 1. MIIN MINUA KÄYTETÄÄN

Hei! Minä olen Willy syylänpoista ja yhdessä teemme tämän! Pullo sisältää näkymättömän, kiihottoman nesteen joka poistaa syylät tehokkaasti. Sisällän monokloretikkahappoa jolla on hajottava vaikutus ihoon. Syylä häviää kerros kerroksen jälkeen. Monokloretikkahappo varmistaa että sellit jotka sisältävät syylä-viruksen häviää.

### 1. MITEN MINUA KÄYTETÄÄN

Lapsivarma korkki avataan näin: Aseta minut vakaalle alustalle joka kestää syövyttävän nesteen. Vältä kosketusta vaatteiden, tekstiileiden tai pöytäliinojen kanssa. Aavaat korkin painamalla alaspin samanaikaisesti kun käännet korkia. Poista korkki.

Käytä minua vain kerran viikossa. Jotta iho syylän ympäillä ei vaurioituisi nesteen syövyttävästä tehosta, suojaaa ihoa syylän ympäillä esimerkiksi vaseliinilla tai sinkkivoiteella.

Kuivaa lasta ensin paperilla ja kasta se sitten pulloon niin että pieni määri nestettä tarttuu

lastaan. Siten et sivele liian paljon nestettä syylään.

Käyttäen lastaa, sivele pieni määriä Kidsner Wart:iä syylän päälle (älä anna nesteen tippua). Pidä huoli että sivelet minua vain syylään. Anna kuivua hetken. Peitä syylä laastarilla. Viikon kuluttua syylä häviää kerros kerroksen jälkeen. Nesteen kestää viikko hävitää ihon läpinnalta, joten et tule näkemään tuloksia heti.

Jonkin ajan kuluttua syylä-sellit ovat hävinnyt, syylä saa valkoisen värin ja häviää. Älä käytä minua useimmin kuin kerran viikossa.

Riippuen syylän koosta ja paksuudesta, voi olla tarpeellista toistaa hoito viikon kuluttua. Syylät ovat tartuttavia, joten älä käytä tuotetta kuin yhdelle henkilölle.

Käytä minua varoen. Neste on syövyttävä. Ole erityisen varovainen kun käytät tuotetta vartalon osiin jotka ovat vaikeampi tavoittaa. Tämä päätee erityisesti henkilöihin joilla on rajoitettu liikkuvus tai hienomotoriikka (vapisevat kädet, jykyt sormet). Sulje pullo varovasti käytön jälkeen.

### 3. OLE VAROVAINEN

Älä käytä minua:

- Jos olet alle 4 vuotias
- Enemmän kuin 30 päivää yhtäjätkoisesti
- Jos olet yliherkkä yhdelle tai useammalle ainesosista
- Kasvoihin (nesteen ei koskaan tule olla kontaktissa silmiin tai nenän tai suun limakalvoihin)
- Sukupuolielinten syyliin
- Syntymämerkkeihin, haavoihin, luomuihin, tummiin, karvaisiin tai oudon näköisiin syyliin.
- Punaisiin tai tulehtuneisiin syyliin
- Heti syylien kirurgisen poiston jälkeen, syylien jäädytyshoidon jälkeen tai laserhoidon jälkeen.

Varsinkin jos iho punottaa tai sattuu hoidon jälkeen. Tässä tapauksessa tulee odottaa vähintään neljä viikkoa, kunnes punoitus tai tulehdus on hävinnyt kokonaan. Vain tämän jälkeen voit jälleen käyttää minua.

Läkkeiden yhteisvaikutukset Tunnettuja negatiivisia vaikutuksia

• Raskauden ja imetyksen aikana

- Syyliin jotka ovat täysin tai osittain kynnen alla.

Ole erityisen varovainen kun käytät minua:

- Jos diagnoosi on epävarma (muutosta ihossa ei voida selkeästi selittää syyläksi)
- Jos sinulla on immuunipuutos (esimerkiksi jos käytät systoatistista lääkeystä)
- Jos sinulla on diabetes tai verisuonisairaus, jonka takia haavat paranevat huonommin.

Näissä tapauksissa, älä käytä minua ennen kun olet käännyt lääkärin puoleen.

### Varoitukset:

- Vain ulkoiseen käyttöön
- Käytä vain käsien ja jalkojen syyliin
- Käytä minua varoen. Neste on syövyttävä.
- Jos nestettä tulee terveelle iholle, huuhtele vedellä. Jos iho tätä huolimatta ärtyy, se on hoidettava samalla tavalla kuin palovammat.
- Ota yhteytä lääkäriisi jos oireet eivät häviä.
- Sulje pullo kunnolla käytön jälkeen ja säilytä se pystyasennossa.
- Pitä pienten lasten ulottuvilta.
- Älä käytä minua ilman vanhempiesi läsnäoloa.
- Vältä kosketusta vaatteiden, tekstiileiden, pöytäliinojen tai ihan kanssa.
- Kynsien vieressä olevien sylien käsittely voi olla tuskallista, sillä neste voi imetyä kynnen alle ja aiheuttaa ärsytystä herkälle iholle.
- Lopeta käyttö, jos rakkuloita ilmenee

Haittavaikutukset Voin aiheuttaa joitakin haittavaikutuksia, vaikka kaikki eivät näitä koe. Haittavaikutukset jotka saattaa ilmetä ovat: ärtynyt iho, polttava tunne, punoittava iho, tai yliherkkyysreaktiot. Jos mikään näistä haittavaikutuksista kehittyy vakavaksi, tai jos huomaat sivuvaikutuksia joita ei olla lueteltu käyttöohjeessa, ota yhteytä lääkäriisi tai farmaseutiin.

Läkkeiden yhteisvaikutukset Tunnettuja negatiivisia vaikutuksia

ei ole minun ja muiden lääkkeiden käytön yhteydessä.

### 4. AINESOSAT

Monokloretikkahappo, sterili vesi

### 5. MINUN SÄILYTTÄMINEN

Säilytä alkuperäispakkauksessa 15–25 °C:n lämpötilassa kuivassa ja pimeässä paikassa. Viimeinen käyttöpäivä on painettu pakkauksen pohjaan. Säilytä 1 kuukauden avaamisen jälkeen.

### 6. YHTEYSTIETONI

Kaikki minuun liittyvät kysymykset tulee lähetä jälkelijalle. Lisätietoja löytyy sivustolta [www.kidsner.fi](http://www.kidsner.fi)

Olen lääketieteellinen laite, lue pakkauksesteeni ennen käyttää.


### Jakelija

TMOS Pharma AS  
Camilla Colletts veg 31  
2407 Elverum Norja  
[www.kidsner.fi](http://www.kidsner.fi)

### Tuottaja

P.K. Benelux B.V.  
Vluchtoord 17  
5406 XP Uden  
Alankomaat

Viimeinen tarkistettu painos:  
Lokakuu 2018



Torka först applikatorn med papper. Säck sedan applikatorn igen i flaskan så att endast lite vätska sätter sig fast. På så sätt applicerar du inte för mycket vätska mot vårtan.

Tillsätt sedan en liten mängd Kidsner på vårtan med applikatorn (lätt inte vätskan tippa). Se till att jag bara hamnar på dina vårtor. Låt mig torka en stund, så kan du sätta på ett plåster. Efter en vecka löser vårtan upp sig, lager för lager. Min vätska behöver en vecka för att lösa upp det övre lagret av huden, så du kan inte se några resultat omedelbart efter appliceringen.

### INNEHÅLL INSTRUKTIONER

1. ANVÄND MIG TILL
2. HUR DU ANVÄNDER MIG
3. VAR FÖRSIKTIG MED MIG
4. MIN INNEHÅLLS-FÖRTECKNING
5. HUR SKA DU LAGRA MIG?
6. MIN KONTAKT-INFORMATION

**1. ANVÄND MIG TILL**  
Hej på dig! Jag är Willy vårborttagaren, och tillsammans skall vi göra det här! Denna flaska innehåller en osynlig, icke-glänsande, lokal gel som effektivt tar bort vårtor och fotvårtor. Jag innehåller monoklorättiksyra, ett ämne som har en nedbrytande effekt på huden. Vårtan kommer att lösa upp lager för lager. Monoklorättiksyra kommer att säkerställa att celler som innehåller vårtvirus försvinner.

**2. HUR DU ANVÄNDER MIG**  
Den barnsäkra korken öppnar du så här: Placera mig på en stabil yta som får frätande vätska. Undvik kontakt med kläder, textilier eller dukar. Du öppnar korken genom att trycka ner den samtidigt som du vrider på den. Ta bort korken från flaskan.

Använd mig endast en gång i veckan. För att huden runt vårtan inte ska påverkas, rekommenderar vi att smörja med vaselin eller zinkpasta på huden runt vårtan.

infekterade vårtor.

- Omedelbart efter kirurgisk borttagning av vårtor, frysning av vårtor (kryoterapi) eller laserbehandling. Detta gäller speciellt om huden är röd eller smärtig efter behandling. Vänta i minst fyra veckor tills rodnad eller inflammation är helt borta. Först då kan du börja använda mig.
- Om du är gravid eller ammar.
- På vårtor som visas delvis eller helt under nageln.

hudrödhet eller överkänsliga reaktioner. Om några av dessa biverkningar blir allvarliga eller om du märker några biverkningar som inte nämns i bipacksedeln, kontakta din läkare.

Interaktion med andra läkemedel: Det finns ingen känd negativ effekt mellan mig och andra läkemedel.

### 4. MIN INNEHÅLLS-FÖRTECKNING

Monoklorättiksyra, sterilt vatten.

### 5. HUR SKA DU LAGRA MIG?

Förvara mig på en torr mörk plats vid 15–25 °C i originalförpackningen. Mitt utgångsdatum är tryckt på bottens av asken. Jag kan användas i 1 månad efter öppnandet.

**6. MIN KONTAKTINFORMATION**  
Alla frågor om mig kan skickas till distributören. För mer information om mig, besök [www.kidsner.se](http://www.kidsner.se)

Jag är en medicinsk anordning, läs min bipacksedel före användning.

### Distributör

TMOS Pharma AS  
Camilla Colletts veg 31  
2407 Elverum Norge  
[www.kidsner.se](http://www.kidsner.se)

### Tillverkare

P.K. Benelux B.V.  
Vluchtoord 17  
5406 XP Uden  
Nederländerna

Revisionsdatum: Oktober 2018



### Biverkningar

Jag kan orsaka en del biverkningar, men inte alla kommer att uppleva dessa. De biverkningar som kan uppstå är:

irriterad hud, bränndande känsla,



Vennligst les denne brukerveiledningen før du bruker meg. Kast ikke vedlegget, da dette inneholder viktig informasjon.

## INNEHOLDER FØLGENDE INSTRUKSJONER

1. HVA JEG BRUKES TIL
2. HVORDAN BRUKE MEG
3. VÆR FORSIKTIG MED MEG
4. HVA JEG INNEHOLDER
5. HVORDAN OPPBEVAR MEG
6. MINE KONTAKT-OPPLYSNINGER

### 1. HVA JEG BRUKES TIL

Hei på deg! Jeg er Willy vortefjerner og sammen skal vi klare dette! Denne flasken inneholder en usynlig, ikke-skinnende, topisk gele som fjerner vorter og fotvorter effektivt. Jeg inneholder monokloreddiksyre, et stoff som har en nedbrytende effekt på huden. Vorten vil løse seg opp lag for lag. Monokloreddiksyre vil sørge for at celler som inneholder vorte-viruset forsvinner.

### 2. HVORDAN BRUKE MEG

Korken med barnesikring åpnes slik: Sett meg på et stødig underlag som tåler kaustisk væske. Unngå kontakt med klær, tekstiler eller duker. Du åpner korken ved å trykke den ned mens du vrir samtidig. Fjern korken fra flasken. Bruk meg bare en gang i uken. For at huden rundt vorten ikke skal bli skadet av den etsende effekten fra syren, anbefaler vi at du smører vaselin eller sinksalve på huden rundt vorten.

### 3. VÆR FORSIKTIG MED MEG

Ikke bruk meg:

- Til barn under 4 år
- I mer enn 30 dager
- Hvis du er over sensitiv mot en eller flere av ingrediensene
- I ansiktet / væsken skal aldri være i kontakt med øyne eller slimhinner i næse og munn
- Kjønnsvorter eller i underlivet.
- På fødselsmerker, vannvorter, åpne sår, følekker, Nævius, senile (brune) vorter, mørke/hårete vorter eller vorter som ser unormale ut.
- På røde, irriterte eller infiserte vorter.

Først, tørk av applikatoren med papir. Derefter senker du applikatoren ned i flasken slik at litt væske fester seg på den. På denne måten vil du ikke påføre for mye væske på vorten.

Så, legg en liten mengde Kidsner vorbehandling på vorten med applikatoren (ikke la væsken dryppa). Forsikre deg om at jeg kun ligger igjen på vorten. La meg tørke et øyeblikk, så kan du legge på et plaster. Etter en uke

vil vorten løse seg opp, lag etter lag. Væsken min trenger en uke for å løse opp det øverste laget av huden, så du kan ikke se noe resultat umiddelbart etter påføring.

Etter en stund ødelegges cellene i vorten, og vorten får en hvit farge og vil støtes bort. Du må ikke bruke meg mer enn 1 gang i uken. Avhengig av størrelsen og tykkelsen på vorten, kan det være nødvendig å repete behandlingen med meg etter en uke. Vorter er smittsomme. Derfor anbefaler vi ikke at mere en person bruker produktet.

Vær veldig forsiktig når du bruker meg da innholdet i flasken er kaustisk. Vær ekstra forsiktig når du skal bruke meg på kropsdeler som er vanskelige å nå. Dette gjelder spesielt personer med nedsatt mobilitet eller i tilfeller med forstyrret finmotorikk (skjelvende hender, stive fingre). Lukk flasken min forsiktig etter bruk.

### Advarsler:

- Advarsler:
- Kun for utvortes bruk
- Bruk meg bare på vorter på hendene og føttene.
- Bruk meg med ytterst forsiktighet. Væsken min er etsende.
- Hvis jeg kommer i kontakt med sunn hud, vennligst skill meg av med vann. Hvis huden blir irritert, selv om du har tatt disse forhåndsreglene, må du bruke samme behandling som du gjør ved brannsår.
- Kontakt lege, hvis plagene dine forsetter.
- Skru korken godt igjen etter bruk og oppbevar den i stående posisjon.
- Oppbevares utilgjengelig for barn
- Ikke bruk meg uten at en av dine foreldre er til stede.
- Unngå kontakt med klær, tekstiler eller hud.
- Behandling av vorter rett ved siden av neglen kan være vondt, da væsken kan absorberes under neglen og skape irritation på den sarte huden.
- Avslutt bruken om det oppstår blemmer.

Bivirkninger  
Jeg kan forårsake noen bivirkninger, men ikke alle vil oppleve disse. Bivirkningene som kan oppstå er: irritert hud, brennende følelse, rødhet i huden eller oversensitive reaksjoner. Hvis noen av disse bivirkningene blir alvorlige, eller om du opplever andre bivirkninger som ikke står i pakningsvedlegget, vennligst kontakt medisinsk hjelp.

Vær ekstra forsiktig når du bruker meg:

- I tilfeller som gjelder diagnose (ændringer i huden som ikke fullstendig kan forklaras som vorte)
- Ved immundefekt (for eksempel når du bruker cytostatisk medisinering)

5. HVORDAN OPPBEVAR MEG  
Oppbevar meg på et tørt mørkt sted med 15-25°C i originalesken. Utløpsdatoen min står printet på bunnen av esken. Jeg kan brukes i 1 måned etter åpning.

### 6. MINE KONTAKTOPPLYSNINGER

Alle spørsmål om meg kan sendes til distributøren. For mere informasjon om meg vennligst besøk [www.kidsner.no](http://www.kidsner.no)

#### Distributør

**■ Produsent**  
P.K. Benelux B.V.  
Vluchtoord 17  
5406 XP Uden  
Nederland

Revision date: Oktober 2018



Trett etter kirurgisk fjerning av vorter, frysning av vorter (kryoterapi) eller laserbehandling. Dette gjelder spesielt om huden er rød eller smertefull etter behandlingen. I dette tilfellet skal du vente i minst fire uker, til rødheten eller inflamasjonen er fullstendig borte. Først da kan du starte å bruke meg.

• Hvis du er gravid eller ammer.

• På vorter som oppstår delvis eller

fullstendig under neglen.

Bivirkninger  
Jeg kan forårsake noen bivirkninger, men ikke alle vil oppleve disse. Bivirkningene som kan oppstå er: irritert hud, brennende følelse, rødhet i huden eller oversensitive reaksjoner. Hvis noen av disse bivirkningene blir alvorlige, eller om du opplever andre bivirkninger som ikke står i pakningsvedlegget, vennligst kontakt medisinsk hjulp.

Interaksjon med andre medisiner  
Det finnes ingen kjent negativ effekt mellom meg og andre medisiner.

### 4. MINE INGREDIENSER

Monokloreddiksyre, sterilt vann.

Tør først applikatoren af med papir. Derefter sækkes applikatoren ned i flasken, så noget gel klæber til den. På denne måde vil du ikke anvende for mye gel til vorten.

Så påfør en lille smule Kidsner vorbehandling på vorten med applikatoren (lad ikke væsken dryppa). Sørg for, at jeg kun påføres på vorten. Lad mig tørre et øyeblikk, så du kan lægge et plaster på. Etter en uke oploses

vorten, lag for lag. Min væske har bruk for en uke til at opløse det øverste lag av huden, så du kan ikke se resultater umiddelbart etter påføring.

**INDHOLDSANVISNINGER**  
**1. ANVEND MIG TIL**  
**2. HVORDAN ANVENDES JEG**  
**3. VÆR FORSIKTIG MED MIG**  
**4. HVAD INDEHOLDER JEG**  
**5. HVORDAN OPBEVARES JEG**  
**6. MINE KONTAKTOPPLYSNINGER**

Efter et stykke tid bliver cellerne ødelagt i vorten, og vorten får en hvid farge og blir ofstødt. Brug mig ikke mere end en gang om ugen. Afhængig af vortens størrelse og tykkelse kan det være nødvendigt at gentage min behandling efter en uke. Vorter er smitsomme. Derfor anbefaler vi ikke, at flere mennesker bruger produktet.

Vær meget forsiktig, når du bruker meg. Indholdet af flasken er etsende. Vær ekstra forsiktig, når du bruker meg på kropsdeler, der er vanskelige å nå. Dette gælder især for personer med nedsat mobilitet eller i tilfælde af forstyrret finmotorik (skælvende hender, stive fingre). Luk forsiktig min flaske efter bruk.

### 2. HVORDAN ANVENDES JEG

Børnesikkerhedslåget åbner som følger: Sæt mig på en stabil overflade, der kan modstå øetsende væske. Undgå kontakt med tøj, tekstiler eller dugs eller ligende. Du åbner sikkerhedslåget ved at skubbe den ned, samtidig med du drejer. Fjern låget fra flasken. Brug mig kun en gang om ugen. For at huden omkring vorten ikke bliver beskadiget af den øetsende virkning af syren, anbefaler vi at smøre vaseline eller zink salve på huden omkring vorten.

**3. VÆR FORSIKTIG MED MIG**  
Brug meg ikke:

- For børn under 4 år
- I mere end 30 sammenhængende dage
- Hvis du er overfølsom over for en eller flere af ingredienserne
- I ansigtet / væsken må aldrig komme i kontakt med øjne eller slimhinder i næse og mund
- Kønsvorter eller vorter på kønsdelene.
- I modernærker, vandvorter, åbne sår, skønhedspletter, Nævius, senile (brune) vorter, mørke / behårede vorter eller vorter, der ser

unormale ud.

- På røde, irriterede eller inficerede vorter.
- Umiddelbart efter kirurgisk fjernelse af vorter, frysning av vorter (kryoterapi) eller laserbehandling. Dette gælder især hvis huden er rød eller smertefull efter behandlingen.

Så påfør en lille smule Kidsner vorbehandling på vorten med applikatoren (lad ikke væsken dryppa). Sørg for, at jeg kun påføres på vorten. Lad mig tørre et øyeblikk, så du kan lægge et plaster på. Etter en uke oploses

vorten, lag for lag. Min væske har bruk for en uke til at opløse det øverste lag af huden, så du kan ikke se resultater umiddelbart etter påføring.

Vær ekstra forsiktig, når du bruker meg:

- I tilfælde af tvivl ved diagnosen (ændringer i huden, der ikke kan forklaras fuldstændigt som vorte)
- I tilfælde af immundefekt (for eksempel ved anvendelse af cytostatisk medicin)

**4. MINE INDHOLDSSTOFFER**  
Monokloreddiksyre, sterilt vand.

**5. HVORDAN OPBEVARES JEG**  
Opbevares på et tørt mørkt sted ved 15-25 °C i den originale æske. Min udløbsdato er trykt i bunden af æsken. Jeg kan bruges i 1 måned efter åbningen.

**6. MINE KONTAKTOPPLYSNINGER**  
Alle spørsmål om meg kan sendes til distributøren. For mere information om mig besøg venligst [www.kidsner.dk](http://www.kidsner.dk)

**■ Produsent**  
P.K. Benelux B.V.  
Vluchtoord 17  
5406 XP Uden  
Holland

Jeg er et medicinteknisk produkt, læs min brugsanvisning inden bruk.

**Distributør**  
TMOS Pharma AS  
Camilla Colletts veg 31  
2407 Elverum Norge  
[www.kidsner.no](http://www.kidsner.no)

**■ Produsent**  
P.K. Benelux B.V.  
Vluchtoord 17  
5406 XP Uden  
Holland

Revideret: Oktober 2018

